

Ferbio Vitalier



VRSTA DJELOVANJA: Aktivator enzima

PRESENTATION: Mikrogranule potpuno topljive u vodi



FERBIO VITALIER je organski biostimulant i biognojivo na bazi hidroliziranih aminokiselina niske molekularne težine, polisaharida i mikroelemenata. Ima visok sadržaj huminskih ekstrakata i organske tvari, stimulirajući usjev u kritičnim trenucima rasta (ukorjenjivanje, klijanje, cvjetanje (hortikultura) ili povećanje plodova), ili kada postoje stresne situacije zbog agronomskih ili okolišnih uvjeta.

FERBIO VITALIER predstavlja cjeloviti aminogram koji nam pruža uravnoteženu biostimulaciju i biognojdbu, zajedno s fulvičnim kiselinama koje poboljšavaju strukturu tla i organskom tvari koja regenerira mikrobnu floru i doprinosi prehrani.

Osim toga **FERBIO VITALIER** osigurava organski dušik, prirodne biostimulante (betaine, auksine, vitamine, proteine, enzime itd.) i ugljikohidrate.

Sve to pruža visokovrijednu formulaciju za biljku s visokom razinom apsorpcije i asimilacije koja pomaže usjevima da prebrode stresne faze, poboljšava vegetativni razvoj, povećava veličinu plodova, povećava kvalitetu i proizvodnju, kao i poboljšava strukturu tla kada se primjenjuje putem tla.

S druge strane, smanjuje toplinski stres kada temperature i vlažnost okoliša nisu povoljne za usjev, izbjegavajući promjene u rastu ili oštećenje stanica.

SASTAV

Slobodne aminokiseline	13,00%
Organska materija	47,30%
Ukupni huminski ekstrakt	28,00%
Fulvo kiseline	28,00%
Ukupno dušika	8,40%
organski dušik	4,00%
Kalij topiv u vodi K ₂ O	2,10%
Fosfor pentoksid P ₂ O ₅	0,50%
Saharidi	6,20%
Mikroelementi (Fe, Ca, MG, Mn, Zn)	%ppm
Prirodni fitohormoni, vitamini i enzimi	%ppm
Gustoća	1,28 g/cc
pH	6



Asparaginska kiselina	0,34	Glicin	0,35	Prolin	0,30
Glutaminska kiselina	0,42	Histidin	0,13	Serin	0,17
Alanin	0,17	Izoleucin	0,13	Treonin	0,17
Arginin	0,19	Leucin	0,33	Triptofan	0,07
Cistein	0,22	Lizin	0,35	Tirozin	0,17
Fenilalanin	0,22	Metionin	0,04	Valin	0,42

PAKIRANJE:

1l, 5l, 10l, 20l, 1000l

PRIMJENA

FOLIJARNO

Agrumi, masline, vinova loza i voćke (osim šljiva)	200-300 ccm/100L vode, 2-3 primjene tijekom razdoblja predcvatnje, zemetanja plodova i razvoja
Hortikultura	200-300 ccm/Hl, 3-5 tretmana svakih 10-15 dana, počevši nakon presađivanja ili kada je biljka visoka 10-15 cm kod izravne sjetve.

SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

5-10 L/Ha u sljedećim razdobljima: nakon presađivanja, vegetativni rast, predcvatnja, zemetanje i razvoj plodova, kao i u nepovoljnim klimatskim uvjetima, napadu štetnika ili bolesti, nedostacima itd. gdje je oporavak bitan.

Najveće doze primjenjivat će se kod razvijenijih ili većih usjeva.

Kod voćaka, posebno, treba primijeniti tijekom nicanja, izlaska iz mirovanja, predcvatnje i nakon što je zemetanje plodova završeno.

Kod žitarica, izvršiti minimalno 1 primjenu u dozi od 4 L/Ha.

Kod ozimih žitarica primijeniti s proljetnim herbicidom.

Za ljetne žitarice preporučuje se primjena 35-40 dana nakon sjetve.

Specifične antistresne primjene mogu se provesti u dozi od 10 L/Ha.

Može se miješati s većinom gnojiva i fitosanitarnih proizvoda, osim s onima koji imaju jaku kiselu ili lužnatu reakciju.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Izbjegavati ekstremne uvjete skladištenja. Preporučuje se čuvanje proizvoda na temperaturama koje ne prelaze 2°C (minimalno) i 40°C (maksimum). Čuvati na prozračenom mjestu.

PRVA POMOĆ

Udaljite osobu iz kontaminiranog područja.

Kontakt s kožom: Skinite kontaminiranu odjeću. Dobro operite sapunom i vodom.

Kontakt s očima: Isprajte oči tekućom vodom 15 minuta. Nakon toga potražite liječničku pomoć.

Udisanje: Izađite na svjež zrak i potražite liječničku pomoć. U slučaju opijenosti, odvedite osobu u bolnicu i uvijek, ako je moguće, držite se etikete ili pakiranja. Provedite simptomatsko liječenje.

NI U KOJEM SLUČAJU NE OSTAVLJAJTE OSOBU SAMU.

MJERE OPREZA U VEZI SA ZAŠTITOM OPERATORA

Tretmani na otvorenom: Aplikator mora nositi zaštitne rukavice tijekom miješanja/utovara i nanošenja, kao i zaštitnu odjeću za tijelo i noge.

Tretmani u staklenicima: aplikator mora koristiti zaštitne rukavice za kemikalije i masku s filterom za čestice ili masku sa samofiltracijom tijekom miješanja/utovara, kao i zaštitne rukavice za kemikalije i odgovarajuću zaštitnu odjeću za tijelo i noge tijekom nanošenja u stakleniku.

U slučaju ručne primjene, operite svu zaštitnu odjeću nakon upotrebe.