

K@MITE

ferbio

VRSTA DJELOVANJA: Bio protektor

PRESENTATION: Koncentrirani disperzivni gel



K@MITE je proizvod od ekstrakata mahunarki. Proizvod ima fitoprotektivno djelovanje protiv crvenih pauka i grinja (posebno grinja rajčice). To je proizvod koji se može primijeniti na agrume i povrće. Sprječava degradaciju proizvoda kontaktom s vodom. Želatinska formulacija djeluje kao pojačivač. Sadrži osnovnu tvar i pojačivače.

- Potiče kontakt kroz kutikulu.
- Nametnici NE STVARAJU OTPORNOST.
- Izravan kontakt i gutanje.
- Larvicid - nimfa - adulticid.
- Preventivni i kontrolni sloj
- Pogodno za organsku poljoprivredu
- 0 ostataka. Nema MRL-a (maksimalne granice ostataka).

K@MITE je nezamjenjiv u ekološkoj kontroli štetočina. Služi kao hidratantno sredstvo koje poboljšava djelovanje, također ima fungicidno djelovanje protiv gljivica poput oidiuma, plijesni ili alternaria, a također je izvrstan elicitor (biostimulant) i potkopava vlastitu obranu biljaka.

GRINJE

Preventivni učinak i kontrola.

Primjena **K@MITE** -a treba započeti nakon pojave prve jedinke, čak i u trenucima prije žetve.

Nema sigurnosnog razdoblja. Prilagodite količinu vode i tlak primjene na temelju rasprostranjenosti i populacije štetnika.

Kada na usjevu postoji velika količina "paukove mreže", dobra je praksa povećati tlak primjene kako bi se pristupilo fazama nimfi i ličinki, a slično tome i kada postoji velika populacija odraslih jedinki.

Preventivni učinak i suzbijanje.

Primjene treba započeti kada se pojave prvi simptomi bolesti u uzgoju. Važno je provesti rano otkrivanje jer se radi o štetniku koji se razvija u epidemijama.

- Višeciljni, brzo djelovanje i dvostruki učinak: akaricid i fungicid.

Idealan proizvod za upravljanje otpornosti zbog niske ili nulte rezidualnosti.

Preporučuje se primjena prvo ujutro ili kasno poslijepodne.

U to vrijeme štetnici su izloženi, a pomoćna fauna je zaštićena svojim ekološkim navikama.

POTEX: Ovaj proizvod je pojačivač **K@MITE**-a koji djeluje kao nosač na staničnoj razini, poboljšavajući učinkovitost proizvoda u zajedničkim primjenama.

Preporučuje se korištenje 2 l/ha za naprednu kontrolu štetočina RED SPIDER i VASATE.

SASTAV

Sojin lecitin (osnovna tvar)	10,00%
Gustoća	1,1 g/cc
pH	6-7

PAKIRANJE:

1l, 5l, 10l, 20l, 1000l



PRIMJENA

FOLIJARNO

Hortikultura	5 l/ha	
Bobičasto voće	5 l/ha	Započnite s primjenama kada se uoče prvi simptomi. Obavite 2 do 5 primjena, jednu svakih 5 - 10 dana.
Koštuničavo i sjemenkasto voće	3 - 5 l/ha	
Agrumi i tropske kulture	5 l/ha	
Vinsko i stolno grožđe	5 l/ha	4 - 5 primjena, jedna svakih 7 - 12 dana. Preporučljivo je ograničiti primjene nakon zime.
Ukrasno cvijeće	5 l/ha	Primjenjujte 2 do 5 puta, jednom svakih 5 - 10 dana. Ograničite primjenu kada su cvjetovi otvoreni.
Bademi	4 - 5 l/ha	Započnite s primjenama kada se uoče prvi simptomi. Obavite 2 do 5 primjena, jednu svakih 5 - 10 dana.
Industrijski i ekstenzivni usjevi (kukuruz, riža, duhan itd.)	3 - 5 l/ha	

K@MITE je kontaktni proizvod, stoga se prskanjem mora osigurati dobra pokrivenost.

Pokrivku lista treba održavati vlažnom. Mlaznice treba usmjeriti prema vrhu/dnu lista.

MOŽE SE MIJEŠATI SA SUMPOROM I ULJIMA. Kompatibilan s kemijskim akaricidima. Može se koristiti i za otvoreno polje i za uzgoj u staklenicima. Ako vremenski uvjeti pogoduju razvoju štetnika, ponovite po potrebi. Ne miješati s proizvodima s vrlo kiselim i/ili vrlo alkalnim reakcijama.

Nije fitotoksičan proizvod, nema sigurnosno razdoblje.

REGISTRACIJSKI BROJ:

Lecitini Osnovna tvar ispunjava kriterije da se smatra hranom prema definiciji iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća. Odobreno u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju fitosanitarnih proizvoda na tržište. Odobreno provedbenom uredbom (EU) br. 2017/419.

Koristit će se u skladu sa specifičnim uvjetima izvješća SANTE 11809/2016.

Proizvod je u skladu s prilogima standarda EU 834/07 i 889/08.